

Posilující preparáty z rostlin

BYLINA	Příprava (na 10 litrů)	Použití	Způsob aplikace
Cibule		x plíseň šedá, hlemýždi, slimáci (nádorovitost košťálovin)	
Černý bez	(1,5 kg č.natě); nechat vykvasit	Odpuzuje hryzce a hraboše	Do děr a kolem stromů na půdu
Česnek	100 g nakrájených stroužků, přelít 1 l vroucí vody	Roztoči na jahodách, ostružinách, vinné révě; Kadeřavost broskvoní	1:7 koncem dubna a po sklizni 4x po 3 dnech; Neředěný od února do vyrašení po 2 týdnech
Heřmánek		odvar - moření osiva, posiluje	
Kostival		hnojivé zákvasy - K, mulč	
Křen	300 g listů a kořene rozmělnit, namočit na 3 hod do vody a 30 min vařit – do 10 l dešt. vody – 1 den odstát	prevence moniliózy	Neředěný- postřik ovoc. stromů před květem
Kozlík lékařský		Láká kočky, přitahuje hmyz	
Lichořeřišnice	1,5 kg č.natě; Přelít horkou vodou a nechat 3 hod ponořené, občas zamíchat	x mšice, slimáci, bělásek, mravenci, myši (láká některé druhy mšic, slimákům poskytuje úkryt – možnost vychytání)	Neředěný na vlnatku krvavou, 1:10-20 na mšice a červce - postřik
Pelyněk pravý		x rez rybízová, bělásci, dřepčící (salát)	
Přeslička	1,5 kg č. natě (1 den nechat vyluhovat v dešťové vodě, pak 1hod vařit;	Posiluje; prevence proti houbovým chorobám (sněť, strupovitost, padlí, hnědá hniloba, černá skvrnitost i padání klíčnicích rostlin)	ředit 1:5 až 1:10 - postřik na list nebo na půdu, zálivka
Rajčata	(1 kg) zálistky; 14 dní nechat kvasit	Bělásek Slimáci	1-2x týdně postřik košťálovin, zalévání půdy a sazenic
Reveň (Rebarbora)	2 kg č. listů vařit 30 min	proti černým mšicím na fazolech a třešních mravenci, mšice, roztoči, dřepčící; i proti okusu lesní zvěří	3 dny po sobě neředěný
Řebříček	500 g květů svařit a doplnit do 10 l; po 3 dnech scedit	Prevence houbových chorob	1:1
Šalvěj	500 g listů a výhonků zalít horkou vodou a 2 dny nechat vyluhovat	Bělásek a zelné mušky 1:1 – zabraňuje hnití rajčat a brambor, sněti na fazolích, plísní šedé a nepravému padlí na vinné révě	1-2x týdně
Vratič	30 g suš. květů/1 l krátce povařit	Prevence padlí	Postřik jabloní před vyrašením; později 1:3 1x týdně

Použitá literatura: Kern 2004, Kliková 1992; Dostálek a kol. 2000; Sartoriusová 1993; Tabach 1991; Neubauer a kol. 1984; Kott, Moravec 1989; Dolejší 1982; Červená, Červený 1994; Richter 1998; Richter, Severa 1971; Kresánek, Krejča 1988; Pamukov, Achtardžiev 1986; Hoffmanová, Jebavý 1973; Zentrich 1986; Rod 1993.